Priekšlaicīgas dzemdes kakla saīsināšanās iemesli, riska faktori un terapijas metožu efektivitāte

Rīgas Stradiņa universitāte kopā ar Rīgas Dzemdību namu veikuši pētījumu par priekšlaicīgas dzemdes kakla saīsināšanās iemesliem, riska faktoriem un izmantoto terapijas metožu efektivitāti. Pētījumā gūtās atziņas ļāvušas izstrādāt ārstēšanas pieeju jebkurai sievietei ar saīsinātu dzemdes kaklu, uzlabojot ārstēšanas rezultātus.

Pētījumā tika iesaistītas vairāk nekā 100 sievietes, no kurām tika ievākta plaša medicīniskā anamnēze (vēsture), ģenētiskais materiāls un kuras līdz pat izrakstīšanai no Rīgas Dzemdību nama novēroja pētījumā iesaistītie speciālisti.

Balstoties uz pētījuma rezultātiem, speciālistiem būs iespēja piemērot grūtniecēm ar saīsinātu dzemdes kaklu tieši viņām piemērotu terapiju- noteiktās situācijās piedāvājot ķirurģisku ārstēšanu – šuvju uzlikšanu uz dzemdes kakla, bet citos gadījumos iedrošinot to nedarīt.

Plašāka informācija par veikto pētījumu un tā rezultātiem videomateriālā: